


**BUTLLETÍ N°6: ALT CAMP**  
**Avís del 20 de juny de 2016**

**Cultius: Vinya, olivera, ametller, presseguer i nectarina i horta**

**Vinya:**

**Cuc del Raim: Segona generació**

**Moments de tractament i productes:**

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantroprol, indoxacarb, metoxifenocid.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocid,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

• **Camp de Tarragona:**

– **A la zona primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils estem en període de posta d'ous

– **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls estem en període de posta dels ous.

– **A les zones tardanes:** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S<sup>a</sup> Maria, Rodonyà, Masllorenç, s'ha iniciat el vol.

**Si es fa la lluita amb feromones no cal fer cap tractament contra el cuc.**

**Míldiu**

Van apareixent taques en molts indrets. Cal vigilar atentament les vinyes i, en el cas de no haver fet el tractament en el moment recomanat i de trobar taques encara que siguin disperses per la finca, cal tractar per evitar que la infecció continuï. Cal tractar cara per cara i verificar que les dosis s'apliquen correctament.

A les parcel·les que fan agricultura ecològica, si tenen presència de taques han de continuar la protecció.

**PRODUCTES A EMPRAR:** en aquest moment es recomanen productes sistèmics o penetrants, però segons l'estratègia a seguir podem utilitzar els següents...

**CONTACTE:** Oxiclòrid de coure 50% (CUPRAFOR) o similar, Dosis: 3-4kg/ha

**PENETRANTS:** Cimoxanilo+sulfat cupro. (CURZATE C, FESTIVAL) o similar, Dosis: 3-4kg/ha

**SISTÈMICS:** Cimoxanilo+Folpet+Fosetil-AI (TRICERATOX) o similar, Dosis: 1-3kg/ha

**(caràcter del producte més preventiu)**

Metalaxil+Folpet (ARMETIL 50) o (RIDOMIL), o similar, Dosis: 1.5-2.5kg/ha

**(caràcter del producte més curatiu, emprar si ja tenim presència de taques)**

**Cendrosa**

Seguim recordant la importància dels tractaments preventius, el segon dels quals s'ha d'haver fet a l'inici de la floració si es fa amb productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols (per espolvoreig). El tercer tractament s'ha de fer quan el gra de raïm arribi a la mida d'un pèsol, encara que segon varietats es pot intercalar un altre tractament.

**BAIX PENEDÈS**

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

**LA CONCA DE BARBERÀ**

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

**ALT CAMP**

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



**PRODUCTES A EMPRAR:** segons l'estratègia a seguir podem utilitzar els següents...

**LÍQUIDS:**

Metrafenona (VIVANDO) , Dosis: 20cc/100litres d'aigua

Proquinazid (TALENDO) o similar, Dosis: 200-250 cc/ha

Triadimenol (BAYFIDAN) o similar, Dosis: 40cc/100 litres aigua....., entre d'altres

**POLS:** Sofre pols 30-40kg/ha segons creixement de la vegetació.

## Olivera:

### Prays o Punxó

Estem a l'inici del naixement de les larves de la generació que afecta al fruit. En arbequina solament caldrà protegir les plantacions tradicionalment molt afectades, en varietats més sensibles com l'arboçana, la situació és més problemàtica. El tractament s'ha de fer fins dimecres dia 22.

### Corc (*Hylesinus toranio*)

A les finques afectades, majoritàriament al Baix Camp i al Baix Penedès, el moment de fer el tractament contra els corcs que surten de les galeries és ara. Pot fer-se conjuntament amb el de Prays.

## Ametller:

### Brot sec o Fusicocum

Recordem que també durant el mes de juny amb mullenes cal protegir les varietats i les zones sensibles.

## Presseguer i nectarina:

### Mosca de la fruita o ceratitis

Ja s'han localitzat les primeres captures a la zona primerenca del Baix Camp. A partir d'ara, cal anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

## Horta:

### Tomaquera (*Tuta absoluta*)

Les poblacions són baixes, però cal estar atents. Recordeu que els mírids depredadors ens poden fer un bon control de la plaga, a més a més d'ajudar-nos a controlar la mosca blanca. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuos amb aquests individus.

L'eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions

### Patata (Escarabat de la patata i Palometa)

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) del escarabat, tractar.

Per tal d'evitar l'atac de la Palometa s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.

Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic

Lluís Serra Antolí

Tècnic de l'ADV CELLERS DOMENYS

Telf. 685 10 85 68

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10