



Butlletí nº8: ALT CAMP
Cultius: Vinya, olivera, noguer, fruiters i horta

01/08/2016

Vinya:

Cuc del raïm: Tercera generació

ATENCIÓ: PER A ZONES SENSE FEROMONES

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: clorantraniprol, indoxacarb i metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, i tebufenocide.

Màxima eclosió: clorpirifos i metil clorpirifos

*Camp de Tarragona:

- **A la zona primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils ja es va donar l'avís.

- **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Alió, Valls la màxima eclosió és dimarts 2, dimecres 3 i dijous 4.

- **A les zones tardanes:** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Rodonyà, Masllorènç, l'inici de l'eclosió és dimecres 3 i dijous 4.

- **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra, s'ha iniciat el vol.

BOTRITIS: es recomana realitzar un tractament antibotritis (tractar cara per cara) (Productes, CHORUS, PYRUS o similar). Es pot aprofitar el tractament del cuc per realitzar aquest tractament.

Míldiu

Recordem que després de la pluja del passat divendres dia 22, especialment a les comarques en les que més va ploure força, com són Conca de Barberà, Alt Camp i Baix Penedès, vam aconsellar un tractament.

Cendrosa

Estem trobant força incidència d'aquesta malaltia, cal observar les zones i varietats sensibles i en cas de tenir problemes cal protegir.

Olivera:

Mosca de la oliva. *Bractocera oleae*

A la comarca del Baix Penedès, han augmentat les captures i l'índex de picades, el que fa recomanable fer un tractament durant la propera setmana de l'1 fins el divendres 5 d'agost. A la Comarca de l'Alt Camp, en la varietat Menya que és la més sensible de la zona, cal fer un tractament durant aquesta setmana. A les altres comarques i en la varietat Arbequina, cal estar atents.

Si s'utilitza el caolí, de manera general ja s'ha d'iniciar el tractament de protecció.

És important completar aquestes informacions realitzant controls d'olives picades pels mateixos pagesos i intervenir si es supera el 5%.

Noguer:

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERA

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



Carpocapsa

S'ha iniciat el vol de la segona generació. Tractar si es supera el llindar de tractament.

Fruiters:

Mosca de la fruita o ceratitis

Cal anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

Horta:

Horta en general

Erugues

Han augmentat les poblacions d'algunes erugues polífagues com són *Helicoverpa armigera* i *Spodoptera exigua*. Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Cucurbitàcies: Cendrosa

S'ha observat cendrosa en diferents finques, aquest fong es manifesta com a taques polsoses tant a l'anvers com al revers de les fulles.

Els tractaments es realitzaran quan s'observin els primers símptomes.

Tomaquera: *Tuta absoluta*

Les poblacions són baixes, però cal estar atents. Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Cuc del tomàquet o *Heliothis*

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Cul negre

Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

Avisos realitzats en xarxa entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.
Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic

Lluís Serra Antolí

Tècnic de l'ADV CELLERS DOMENYS

Telf. 685 10 85 68

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10