


**BUTLLETÍ N°8: CONCA DE BARBERÀ**
**29 de juny de 2015**
**Cultius: Vinya, noguer, fruiters, fruiters de pinyol i horta**
**Vinya**
**Cuc del Raïm: Segona generació**
**Moments de tractament i productes:**

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantroprol, indoxacarb, metoxifenocid.

 Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocid,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos.

**Conca de Barberà:**

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà ja es va donar l'avís.
- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga la màxima eclosió és dimarts 30, dimecres 1 i dijous 2 de juliol. Tractament amb clorpirifos.
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort l'inici de l'eclosió és dimarts 30 i dimecres 1 de juliol. Esperar a propera avisos si es fa amb clorpirifos.

**Cendrosa:** Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles. Si es tracta amb sofre pols vigilar els períodes de calor intensa (>35°C podem cremar el raïm).

**Noguer**

**Carpocapsa:** Esteu atents al contestador per l'avís de segona generació.

**Fruiters**

**Mosca de la fruita o ceratitis:** Les poblacions de mosca han augmentat. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

**Fruiters de pinyol**

**Monilia:** Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

**Cendrosa en fulla:** Estem trobant plantacions joves de presseguer amb afectació, esteu atents.

**Horta en general:**

**Pugó i erugues:** Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

**Tomàquet:**

**Tuta absoluta:** Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringiensis* respectuosos amb la fauna auxiliar.

**Cul negre:** Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

**Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*):** Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu. Avís realitzat conjuntament amb el Servei de Sanitat Vegetal i les ADV's de la zona.

Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic

Lluís Serra Antolí  
 Tècnic de l'ADV CELLERS DOMENYS  
 Telf. 685 10 85 68

**BAIX PENEDÈS**

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

**LA CONCA DE BARBERÀ**

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

**ALT CAMP**

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10