

**BUTLLETÍ N°16: 20 D'AGOST DE 2021 (CONCA DE BARBERÀ)**

Avís 8/2021

**Cultius:**
**Vinya, olivera**
**Vinya**
**Cuc del raïm**
**Moments de tractament i productes:**

Abans de vol: feromona líquida (1)

Inici de vol: fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: clorantraniliprol, indoxacarb

 Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis* (2), spinosad(2), spinetoram i tebufenocide.

(1) Aplicar abans de l'inici del vol de cada generació

(2) Autoritzat en agricultura ecològica

Us recordem que tot i que hi ha piretroids autoritzats en vinya no es recomanen per ser afavoridors d'àcars.

**ZONA PRIMERENCA (3a Generació)**

- Inici de vol: 30 de juliol
- Període de posta: 6 fins 10 d'agost
- Inici d'eclosió: 12 fins 16 d'agost

**ZONA MITJANA (3a Generació)**

- Inici de vol: 3 d'agost
- Període de posta: 9 al 13 d'agost
- Inici d'eclosió: 15 al 17 d'agost

**ZONA TARDANA (3a Generació)**

- Inici de vol: 11 d'agost
- Període de posta: 16 fins 19 d'agost
- Inici d'eclosió: 22 fins 24 d'agost



En totes les zones el nivell d'incidència del corc del raïm és alt. Els danys produïts pel cuc al fer les penetracions al gra pot desenvolupar podrits si les condicions de temperatura i humitat són favorables al fong.

A Vallverd, no s'ha trobat posta i no cal fer tractament per a aquesta generació.

**BAIX PENEDES**

 Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

**LA CONCA DE BARBERÀ**

 Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

**ALT CAMP**

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



### Míldiu

Tot i que el risc de contaminació del fong és baix cal estar atents a l'evolució de les temperatures dels propers dies.

Segons la fenologia de la vinya el risc és baix i no cal fer cap tractament.

### Cendrosa

S'està detectant presència de malura a les vinyes.

En el cas que observeu presència del fong als raïms, es recomana mantenir la protecció.

Hi han afectacions importants de malura en algunes vinyes de la comarca. Si observeu la presència del fong en raïm renoveu tractaments a mesura que acabi la persistència dels producte fins el verolat. A fi de prevenir possibles fitotoxicitats, eviteu aplicar sofre en pols si les temperatures superen els 30°C.

#### BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

#### LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

#### ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



### Estratègia convencional (en parèntesi el termini de seguretat del producte)

- MEPTILDINOCAP (21 dies)
- BOSCALIDA + KRESOXIM-METIL (28 dies)
- PROQUINAZID (28 dies)

Si trieu aquesta opció tingueu en compte que **no podreu entrar raïm** fins que transcorri el termini de seguretat del producte. Especial atenció a les varietats Chardonnay i Macabeu.

### Estratègia ecològica

- HIDROGENOCARBONAT DE POTASSI + SOFRE LÍQUID → Dosis: 5 kg/ha i 2,5 l/ha, respectivament. Pujar 30% volum de caldo estàndard.
- OLI DE TARONJA (incompatibilitats amb sofres, heu de deixar transcórrer entre aplicacions de sofre i oli de taronja 21 dies)
- POLISULFUR DE CALÇ (Reduir dosis amb temperatures >30°C) → Aquest producte té major eficàcia a la caiguda de la fulla, entre el plor i la formació del primer borró i en prefloració.

## Olivera

### Mosca de l'oliva (*Bactrocera oleae*)

A la zona litoral del Baix Camp i del Tarragonès la posta encara és baixa, i no es recomana un tractament de manera generalitzada. Igualment, degut a que els atacs de mosca son molt irregulars, per part dels agricultors es recomana fer recompte de picada per completar la informació de la pròpia finca, i vigilar que no es superen els llindars.

El llindar de tractament és d'un 5% d'oliva picada si s'utilitza un producte larvicida i d'un 3% si s'utilitza un producte adulticida.

A la resta de zones estiguen atents al contestador.

Recordeu que actualment només hi ha dos productes larvicides per a tota la campanya: l'acetamiprid i el fosmet. Vigileu les característiques de cada producte i l'estratègia a seguir en cada generació de la mosca. Si escau, consulteu al vostre tècnic.

A la Conca de Barberà estan augmentant les picades en oliva grossa, com les varietats Gordal o Grossal, es recomana fer un tractament del 6 al 10 d'agost. El llindar de tractament és d'un 5% si s'utilitza un producte larvicida i d'un 3% si s'utilitza un producte adulticida.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

[www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

## ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

### BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

### LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

### ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10