


**BUTLLETÍ N°9: PENEDEès**

Avís del dia: 22 de juliol de 2016

**Cultius:**
**Vinya, olivera, noguer, fruiters de pinyol i horta**
**Vinya:**
**Cuc del Raïm: Tercera generació**
**ATENCIÓ: PER A ZONES SENSE FEROMONES**
**Moments de tractament i productes:**

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantroprol, indoxacarb, metoxifenocid.

 Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocid,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos.

- **Baix Penedès:**

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell, l'inici d'eclosió serà divendres 22 i dissabte 23 de juliol. La màxima eclosió és dimarts 26, dimecres 27 i dijous 28 (CLORPIRIFOS a 1.5l/ha)

- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres estem en període de posta. Esperar properes notificacions,

**BOTRITIS:** es recomana realitzar un tractament antibotritis (tractar cara per cara) (Productes, CHORUS, PYRUS o similar). Es pot aprofitar el tractament del cuc per realitzar aquest tractament.

**Cendrosa:** Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles. Cal protegir els raïms fins que l'enverat sigui complet (varietats negres) o fins que la maduració sigui clarament iniciada (varietats blanques).

**Olivera:**
**Mosca de la oliva. *Bractocera oleae***

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en varietat arbequina.

En els darrers controls, les captures són baixes i el % d'olives picades també. No cal intervenir en general. Malgrat tot, és important a partir d'ara; completar aquestes informacions realitzant controls d'olives picades pels mateixos pagesos i intervenir si es supera el 5%.

Si s'utilitza la tècnica de la captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a partir d'aquest moment.

**Noguer:**
**Carpocapsa**

S'ha iniciat el vol de la segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

**BAIX PENEDEès**

 Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

**LA CONCA DE BARBERÀ**

 Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

**ALT CAMP**

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



## Fruiters de pinyol:

### Mosca de la fruita o ceratitis

Recordem que cal anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

### Grafolita

En plantacions de presseguer s'ha detectat un augment de les captures d'aquesta plaga. Cal protegir les finques tradicionalment afectades.

## Horta:

### Horta en general: Erugues

Han augmentat les poblacions d'algunes erugues polífagues com són *Helicoverpa armigera* i *Spodoptera exigua*. Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

### Cucurbitàcies

#### Cendrosa

S'ha observat cendrosa en diferents finques, aquest fong es manifesta com a taques polsoses tant a l'anvers com al revers de les fulles. Els tractaments es realitzaran quan s'observin els primers símptomes.

### Tomaquera

#### *Tuta absoluta*

Les poblacions són baixes, però cal estar atents. Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

#### Cuc del tomàquet o Heliothis

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

#### Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

#### Cul negre

Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu. Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic

Lluís Serra Antolí  
 Tècnic de l'ADV CELLERS DOMENYS  
 Telf. 685 10 85 68

#### BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

#### LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

#### ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10