


**BUTLLETÍ N° 10: PENEDÈS**
**27/07/2016**
**Cultius: Vinya, olivera, noguer, fruiters i horta**
**CALAMARSA**

La nit del divendres al dissabte va caure una quantiosa pluja de manera general. A les comarques del Baix Penedès i Conca de Barberà la pluja va anar acompanyada de calamarsa, així que a les zones afectades de vinya cal protegir el més aviat possible amb barreges de compostos de coure amb folpet o productes antibotritis específics. En el cas de l'olivera protegir amb compostos cúprics.

**Vinya:**
**Cuc del raïm: Tercera generació**
**ATENCIÓ: PER A ZONES SENSE FEROMONES**
**Moments de tractament i productes:**

Inici de vol: fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: clorantraniprol, indoxacarb i metoxifenocide.

 Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, i tebufenocide.

Màxima eclosió: clorpirifos i metil clorpirifos

**• Baix Penedès:**

 – **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell, la màxima eclosió és dimarts 26, dimecres 27 i dijous 28 (CLORPIRIFOS 1.5l/ha)

 – **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres l'inici de l'eclosió és divendres 29 i dissabte 30. Per a realitzar el tractament amb clorpirifos esperar el proper avís de màxima eclosió.

**BOTRITIS:** es recomana realitzar un tractament antibotritis (tractar cara per cara) (Productes, CHORUS, PYRUS o similar). Es pot aprofitar el tractament del cuc per realitzar aquest tractament.

**Míldiu**

Les pluges de la nit del divendres van ser importants. S'aconsella fer un tractament general amb compostos cúprics. En les finques amb presència de taques cal afegir un producte penetrant o sistèmic. Si es fa un tractament cicratitzant serveix ja com antimíldiu.

**Cendrosa**

Estem trobant força incidència d'aquesta malaltia, cal observar les zones i varietats sensibles i en cas de tenir problemes cal protegir.

**Olivera:**
**Mosca de la oliva. *Bractocera oleae***

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en varietat arbequina.

En els darrers controls, les captures son baixes i el % d'olives picades també. No cal intervenir en general. Malgrat tot, com aquest cultiu és molt irregular, és important completar aquestes informacions realitzant controls d'olives picades pels mateixos pagesos i intervenir si es supera el 5%.

Si s'utilitza la tècnica de la captura massiva per al control de la plaga, és recomanable col·locar els mosquers a partir d'aquest moment.

**BAIX PENEDÈS**

 Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

**LA CONCA DE BARBERÀ**

 Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

**ALT CAMP**

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



## Noguer:

### Carpocapsa

S'ha iniciat el vol de la segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

## Fruiters:

### Mosca de la fruita o ceratitis

Recordem que cal anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

### Grafolita

En plantacions de presseguer s'ha detectat un augment de les captures d'aquesta plaga. Cal protegir les finques tradicionalment afectades.

## Horta:

### Horta en general

### Erugues

Han augmentat les poblacions d'algunes erugues polífagues com són *Helicoverpa armigera* i *Spodoptera exigua*. Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

### Cucurbitàcies

### Cendrosa

S'ha observat cendrosa en diferents finques, aquest fong es manifesta com a taques polsoses tant a l'anvers com al revers de les fulles.

Els tractaments es realitzaran quan s'observin els primers símptomes.

### Tomaquera

**Tuta absoluta:** Les poblacions són baixes. Amb nivells moderats de plaga tractar amb *Bacillus thuringiensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

### Cuc del tomàquet o Heliothis

Els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

### Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

**Cul negre:** Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.  
Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic

Lluís Serra Antolí  
Tècnic de l'ADV CELLERS DOMENYS  
Telf. 685 10 85 68

#### BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

#### LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

#### ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10